

TAIFUN tanninfrei

Für empfindliche Mägen



Vorteile:

- standfest und ertragreich
- Ihre Tanninfreiheit macht die Sorte TAIFUN interessant für die Mast.
- weißblühend und mittelfrüher Blühbeginn

Anbau:

TAIFUN ist für alle Ackerbohnen-Standorte geeignet und wird für die Fütterung von Monogastriern, Geflügel und Fischen empfohlen.

U.a. für den Anbau 2022 in Rheinland-Pfalz empfohlen!

Kurzprofil:

---- = sehr niedrig/früh/kurz,

++++ = sehr hoch/spät/lang

Kornertrag	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Blühbeginn	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Standfestigkeit	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rohproteinерtrag	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rohproteingehalt	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

TAIFUN tanninfrei

Für empfindliche Mägen

Nabelfarbe	schwarz
------------	---------

Entwicklung:

Blühbeginn	
Reife	
Pflanzenlänge	

Vitalität:

Standfestigkeit	
Ascochyta	
Botrytis	
Rost	

Ertrag und Qualität:

Ertrag und Qualität	iedrigeres Ertragsniveau als buntblühende Sorten
Kornertrag	
TKM	
Rohproteinertrag	
Rohproteingehalt	
Tanningehalt	tanninfrei

TAIFUN tanninfrei

Für empfindliche Mägen

Aussaat:

Saatzeit	tanninfreie Sorten haben einen höheren Anspruch an die Aussaatbedingungen und den Bodenzustand. Eine zu frühe Aussaat oder Frostbestellung wird nicht empfohlen. Keimpflanzen sind frosttolerant bis -5°C.
<u>Saatstärke (keimfähige Samen/m²)</u>	
günstige Saatbedingungen	35-40
normale Saatbedingungen	40-45
ungünstige Saatbedingungen	50-55
<u>Saattiefe (cm)</u>	
leichte Böden	8-10
schwere Böden	6-8
Reihenabstand	Einfacher oder doppelter Reihenabstand ist ertraglich günstig, höhere Reihenabstände verbunden mit einer Einzelkornaussaat sind möglich.

Düngung:

Düngung	nach guter fachlicher Praxis
Kalkung	zur Leguminose auf bodenarttypischen pH-Wert
Grunddüngung	nach Entzug bei mittlerer Versorgung und Ertragsniveau: 40-60 kg/ha P ₂ O ₅ ; 100-130 kg/ha K ₂ O; 20-50 kg/ha MgO
Stickstoff	keine N-Düngung
Spurenelemente	nach Bedarf in Kombination mit Pflanzenschutzmaßnahmen

Pflanzenschutz:

Pflanzenschutz	in Abstimmung mit dem örtlichen Pflanzenschutzdienst
Unkraut / Ungras	Herbizidanwendungen sind im Vor- und Nachauflauf möglich. Ackerbohnen bieten gute Voraussetzungen für mechanische Unkrautbekämpfung.
Schädlinge	Schwarze Bohnenlaus (Blühbeginn), Ackerbohnenkäfer (Mitte Blüte); im Einzelfall ggf. Behandlung einplanen.
Krankheiten	Schokoladenfleckigkeit ist bei Auftreten mit Fungizidspritzung gut kontrollierbar. Brennfleckenkrankheit wird gut durch sorgfältige Saatguthygiene unterbunden.

Ernte	Gute bis sehr gute Druscheignung durch gleichmäßige Abreife und gute Standfestigkeit; Ernte bei 15–19 % Kornfeuchte; Gefahr von Bruchkörnern bei zu trockener Ernte; schonende Mähdreschereinstellung wählen
-------	--