

FUTTER

... Klee-gras-Mischung für die Ernte nach Winter



Vorteile:

- Stabile Erträge für Futter und Biogas
- Geeignet für Zweikultur-Nutzungssysteme in Kombination mit Mais oder Sorghumhirse
- Nährstoffaufnahme vor der Winterruhe und im zeitigen Frühjahr verhindert Auswaschung
- Organische Substanz aus Wurzeln und Stoppeln verbessert die Humusbilanz und sorgt für einen hohen Vorfruchtwert - ideale Eignung für Carbon Farming
- Nicht empfohlen für Trockenstandorte und Böden mit geringer Wasserhaltekapazität
- Tipp: auch als Untersaat in Mais geeignet
- Ertragspotential: 35 - 40 dt TM/ha

Mischungs-details:

Mischungszusammensetzung Samen-%	49 % Inkarnatklee
	51 % Welsches Weidelgras

ohne Kruziferen, mit Leguminosen, winterhart

FUTTER

... Klee-gras-Mischung für die Ernte nach Winter



Nutzung:

Gründüngung
Eignung zur Biogas- / Futternutzung
Humusaufbau
Wasserschutz / Stickstoffkonservierung
Erosionsschutz
Stickstoffanreicherung

Fruchtfolgeeignung:

+ geeignet / ++ besonders empfohlen

Mais	++
Getreide	++
Raps	+
Zuckerrüben	+
Kartoffeln	+
Leguminosen	

Agronomische Merkmale:

schlecht / früh / kurz / gering

gut / spät / lang / hoch

Unkrautunterdrückung	<div style="width: 75%; background-color: #92d050;"></div>
Erosionsschutz	<div style="width: 95%; background-color: #92d050;"></div>
Wasserschutz / Stickstoffkonservierung	<div style="width: 80%; background-color: #92d050;"></div>
Humusaufbau	<div style="width: 90%; background-color: #92d050;"></div>
Kälte- und Frostresistenz	<div style="width: 95%; background-color: #92d050;"></div>
Trockentoleranz	<div style="width: 70%; background-color: #92d050;"></div>
Wurzeltyp	Büschelwurzel
Maximale Durchwurzelungstiefe	120 cm

Anbau:

Empfohlene Aussaatstärke	35 - 40 kg/ha
Saattiefe	2 - 4 cm
Aussaatperiode	Mitte bis Ende September als Winterzwischenfrucht oder Ende Juli bis Anfang August als Sommerzwischenfrucht
Düngung	Relevanter Leguminosenanteil laut DüV: 46 Samen-%, 51 Gewichts-%
Pflanzenschutz	Pflanzenschutzmaßnahmen sind in der Regel nicht notwendig
Aussaatverfahren	Drillsaat
Ernte	Als Grünfütter und Silage mit Ladewagen oder Häcksler nach Anwelkphase
Erntetermin	April bis Anfang Mai, bei früher Aussaat Schnitt vor Winter möglich

FUTTER

... Klee-gras-Mischung für die Ernte nach Winter



AUM Richtlinien

Bundesland	Programm	Bereich	Richtlinie
Der Sorte FUTTER sind keine AUM Richtlinien zugeordnet.			